



## عفونت های بعد از جراحی



**تعریف :** عفونت بعد از عمل به هر عفونی گفته می شود که در طی ۳۰ روز پس از عمل رخ دهد و ممکن است مربوط به خود عمل یا دوره بعد از آن باشد. این عفونت های می توانند شامل خود عفونت در خود زخم، عفونت های عمیق تر در حفره های بدن یا عفونت های دورتر از محل جراحی مانند ذات الریه، مدیاستینیت (Mediastinitis) یا حتی عفونت های ادراری باشند.

### ➤ علائم عفونت پس از جراحی عبارتند از :

تب، احساس خستگی، درد و سوزش هنگام ادرار

### ➤ علائم عفونت در محل برش جراحی:

گرما در محل برش، تورم و سخت شدن محل برش، قرمزی

، ترشح چرک از محل جراحی، درد



## ● چه عواملی سبب ایجاد عفونت پس از جراحی

### می شوند؟

عفونت بعد از جراحی ناشی از میکروبها است که متداول ترین آنها باکتری های استافیلوکوک، استرپتوکوک و سودوموناس هستند. این میکروبها از طریق دست آلوده کادر جراحی، ابزار جراحی آلوده، هوای محیط جراحی، میکروب هایی که از قبل روی سطح و یا درون بدن فرد قرار دارند، باعث عفونت می شوند سایر عوامل دیگر هم عبارتند از:

جراحی طولانی مدت (بیشتر از دو ساعت)

بیماری های پزشکی مانند سرطان، ضعف سیستم ایمنی

بدن، دیابت، سن بالا، اضافه وزن، سیگار کشیدن،

جراحی های اورژانسی و مربوط به شکم

### سخن پایانی

عفونت های پس از جراحی یکی از مواردی است که احتمال ابتلای آن در بسیاری از عمل های جراحی وجود دارد. این عفونت ها در صورت که در بدن توسعه پیدا کنند حتی سبب مرگ هم می شود. اما این خطرات را می توان تنها با روش های پیشگیرانه مانند درمان زخم و مراقبت از بیمار کاهش داد.

### ➤ تهیه کننده: ژیلآ طهماسبی

منبع: اصول پرستاری پوتر و پری

## ● عفونت پس از جراحی چگونه درمان می شود؟

استفاده از آنتی بیوتیک های خوراکی و یا تزریق وریدی تخلیه چرک، آبنسه و یا هماتوم  
اگر پروتزها، صفحات، پیچ و سایر تجهیزات درگیر عفونت شده باشند لازم است تا در اسرع وقت از بدن خارج شوند.